

Recomendaciones Generales

En general deben recibir las vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones, con ciertas consideraciones:

- Algunas vacunas están especialmente recomendadas: **vacuna antigripal** que evita la gripe con sus complicaciones, vacuna para **neumococo** que es una bacteria que provoca infecciones severas y neumonía, vacuna para **meningococo** otra bacteria que causa también infecciones generalizadas y meningitis.
- Es ideal poner al día las vacunas de calendario y las especiales antes del inicio de la terapia inmunosupresora.
- Es importante que siempre que concurra al hospital lleve consigo la libreta o carnet de vacunación del niño o la niña para actualizar el calendario.
- Actualizar el calendario de vacunación de los convivientes del paciente teniendo especial consideración frente a la varicela. Los mayores de 12 meses no vacunados y que no hayan padecido la enfermedad deben recibir dos dosis de vacuna. Si aparece, en estos, una erupción luego de la vacunación, se debe separar del paciente. Los convivientes deben recibir vacuna Salk para poliomielitis, antigripal anual y dos dosis de hepatitis A.

Este folleto no reemplaza la consulta de vacunas con su pediatra



Servicio de Inmunología y Reumatología

Servicio de Epidemiología e Infectología

📍 Pichincha 1890,
Ciudad de Buenos Aires.
República Argentina

☎ (+54 11) 4122-6000

🌐 www.garrahan.gov.ar

Esta publicación es un aporte para la comunidad e instituciones de salud editada por:



☎ (+54 11) 2152-5255

✉ info@fundaciongarrahan.org

🌐 www.fundaciongarrahan.org

📱 /FundGarrahan



VACUNACIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS CON ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS

Información para padres, familiares y pacientes

www.garrahan.gov.ar

Vacunas especiales recomendadas

Neumococo

Vacunar a todos los pacientes especialmente a aquellos que reciban terapia inmunosupresora.

1° Vacuna conjugada 13 valente

- Si es menor a 1 año: a los 2, 4, 6 y 12 meses.
- 1-6 años: 2 dosis con intervalo de 2 meses.
- Mayores de 6 años: 1 dosis.

2° Vacuna polisacárida 23 valente

Se aplica a partir de los 2 años de edad. Aplicar 2 meses luego de la última dosis de neumococo conjugada 13 valente con un refuerzo 3-5 años de la primera si persiste tratamiento inmunosupresor.

Hepatitis A

Se deben aplicar 2 dosis separadas 6-12 meses.

Gripe

Vacunación anual, al niño o niña y a los convivientes o cuidadores. Se puede administrar desde los 6 meses de vida.

Meningococo tetravalente conjugada

Si está bajo tratamiento inmunosupresor:

Menor a 1 año: 3 dosis con refuerzo a los 12 meses.

Mayor a 1 año: 2 dosis con intervalo de 2 meses.

✓ Importante

Los niños y niñas con enfermedades reumáticas, especialmente aquellos bajo tratamiento inmunosupresor pueden tener más predisposición a infecciones, algunas de ellas prevenibles por vacunas, de ahí la importancia de actualizar el calendario. Todos aquellos que reciben inmunosupresores, pueden tener una respuesta más baja comparada con niños sanos, sin embargo, **son seguras y están recomendadas.**

Calendario ampliado en pacientes con enfermedad reumatológica

EDAD	VACUNA	SIN TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR	CON TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR
Recién nacido (antes del egreso de la maternidad)	BCG	✓	✗
Recién nacido (dentro de las 12 horas de vida)	Hepatitis B	✓	✓
2, 4 meses	Rotavirus	✓	✗
2, 4, 6, 15-18 meses Ingreso escolar (5-6 años)	Polio	✓	✗ Sólo contraindicada Sabin oral
2, 4, 6, 15-18 meses	Quíntuple (DTP+Hib+Hep B)	✓	✓
2, 4, 6 y 12 meses	Neumocócica conjugada	✓	✓
3, 5, 15 meses 11 años (dosis pospuesta)	Meningococo	✓	✓
Desde 6 meses y anualmente	Influenza	✓	✓
12 y 18 meses	Hepatitis A	✓	✓
12 meses Ingreso escolar (5-6 años) 11 años (si no tuviera esquema completo)	Triple viral	✓	✗
15 y 18 meses	Varicela	✓	✗
Ingreso escolar (5-6 años)	Triple Bacteriana (DTP)	✓	✓
11 años	Triple Bacteriana Acelular (dTpa)	✓	✓
11 años	VPH (3 dosis: 0, 2 y 6 meses)	✓	✓
11 años, si no tuviera esquema completo (3 dosis)	Hepatitis B	✓	✓
Cada 10 años (continuará el esquema de la dT)	Doble adultos	✓	✓
18 meses y 11 años en región de riesgo	Fiebre amarilla	✓	✗
Mayores de 15 años en región de riesgo	Fiebre hemorrágica argentina	✓	✗

✗ Contraindicada

Esta información será actualizada periódicamente